

感染症予防 お役立ち通信 (No. 2)

テーマ：この時期に注意したい乳幼児の感染症！
～RSウイルス感染症・腸管出血性大腸菌感染症・風疹～

平成29年10月 発行：内吉野保健所

RSウイルスの流行が続いています。今回は、「この時期に注意したい乳幼児の感染症～RSウイルス・腸管出血性大腸菌感染症・風疹～」についてお伝えします。

県内感染症の概況

(「奈良県感染症情報 H29年第41週【10月9日～10月15日】」)

～発行：奈良県感染症情報センター～

報告数 上位3疾患

- 1 感染性胃腸炎
- 2 RSウイルス感染症
- 3 A群溶連菌咽頭炎



☆県内で今シーズン初となる集団感染が発生

- ①ノロウイルス (10月13日)
- ②インフルエンザB型 (10月12日)

1 RSウイルス感染症ってどんな病気？

発熱・咳・鼻水

多くの場合、軽症
(乳児は急性気管支炎、肺炎など
重症化しやすい)
一度かかっても十分な免疫が得られ
ないため何度もかかることがある。
保護者も職員も、かかる！

原因：RSウイルス

咳やくしゃみなどによる
飛沫感染、子どもどうしの
ふれあい等による
接触感染

感染予防のために

- ☆流水・石鹼による手洗い、うがいをしっかりとする！
- ☆タオル、おもちゃの共用はしないようにする！

2 腸管出血性大腸菌感染症ってどんな病気？

激しい腹痛 頻回の水様便、 血便

約5%が溶血性尿毒症症候群(HUS)
や脳症などを合併
個人により感染しても発症しない
場合もある

原因：腸管出血性大腸菌
(O157、O26、O111等)

菌に汚染された食品等
を食べることによる
経口感染

感染予防のために

- ☆O157は少量の菌の量（100個程度）で発病するため、食事前やトイレ後に流水・石鹼による手洗いをしっかりとする！

3 風疹ってどんな病気？

発熱、発疹、リンパ節腫脹
(耳介後部・後頭部・頸部)

多くの場合、約3日間で治る。
(三日ばしかとよばれる)
大人になってかかると重症になりやすい。

原因：風しんウイルス



咳やくしゃみなどによる飛沫感染、子どもどうしのふれあい等による接触感染

感染予防のために

- ☆流水・石鹼による手洗い、うがいをしっかりする!
- ☆タオル、おもちゃの共用はしないようにする!

妊婦が感染すると赤ちゃんに心疾患、聴力障害、白内障などの障害（先天性風しん症候群）が起こる可能性が高いので保護者・職員に対する細心の注意が必要です！

もし！

保護者から「風疹のため欠席します」と連絡が入ったら…
施設での対応

- ・保護者からの情報把握（病状経過、受診した医療機関、検査、診断内容等）
- ・保護者、職員への周知（妊娠中、妊娠希望の保護者、職員への対応として）
- ・嘱託医への連絡
- ・同じクラス、全てのクラスの予防接種歴の未接種者の把握
- ・市町村主管課への報告、相談
- ・保育園、学校欠席者情報収集システム（サーベイランス）への入力
 - *システムに、結核・腸管出血性大腸菌感染症・麻しん・風しんによる出席停止が登録された場合、市町村保育主管課、教育委員会、保健所、県庁などにメールが自動送信されます。つまり、風しんは1例でも、状況確認・対応が必要な疾患と位置づけられています。
- ・保健所への情報提供・相談
- ・職員、園児の健康観察：二次感染者の発症者を確認（およそ4週間）

保育園、学校欠席者情報収集システム（サーベイランス）は、感染症から子どもたちの健康を守るために「日常からの備え」です。主旨をご理解の上、入力について、ご協力お願いします！



【お知らせ】 12月1日は“世界エイズデー”です！

HIV／エイズについては「原因不明で有効な治療法が無く死に至る病」という認識が、未だ、多くあります。しかし、現在では、HIV感染の早期把握、治療の早期開始・継続によりエイズの発症を防ぐことができます。

～内吉野保健所では下記にて「HIV夜間検査」を行います～

*日 時：平成29年12月4日（月）午後5時～午後7時

*場 所：内吉野保健所（五條市本町3丁目1-13）

*要予約：12月1日（金）までに電話（0747-222-3051）で予約

*注意事項：HIVに感染しても、初期は、血液中に抗体やウイルスが検出されない時期があります。そのため、感染のおそれがある時期から、3ヶ月以上経過した後に検査を受ける必要があります。

無料

匿名